

Aus der medizinischen Poliklinik der Universität Bonn.

Direktor: Professor Dr. M. Bürger.

Die Schwankungen der Herzgröße beim Normalen.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt am 8. Dezember 1936.

von

Heinz Daum

aus Neukirchen (Kreis Moers) N.-Rh.

B O N N 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Dozent Dr. Schlomka
Korreferent: Prof. Dr. Bürger



Meinen lieben Eltern!

Bisher war man der Ansicht, daß die Größe des Herzens eines Gefunden, wie sie sich uns im Röntgenbild darstellt, unter gleichen und technisch guten Bedingungen praktisch konstant sei. Demgegenüber fahen wir verschiedentlich bei Erkrankungen extrakardialer Art, wie z. B. bei Kindern, die im Verlauf von Pneumonien mehrfach röntgenologisch untersucht wurden, daß sich die Herzmasse auffällig ändern können. Später konnten wir bei pflichtmäßigen Nachuntersuchungen von sonst vollkommen gefunden Leuten beobachten, daß sich auch hier die Herzmasse oft sogar nicht unwesentlich geändert hatten. Diese Feststellungen waren für uns der Anlaß, die Frage der Schwankungen der Herzgröße beim Normalen systematisch zu bearbeiten. Es geschah aus mehrfachen Gründen:

1. Um einen Beitrag zur Frage der grundsätzlichen röntgenologischen Herzgrößenbeurteilung zu leisten.
2. Um im einzelnen, besonders im Hinblick auf die etwaige Beurteilung von Änderungen der Herzgröße beim Kranken, sei es im Fortgang des Leidens an sich, sei es unter irgendeiner Behandlungsart klarer sehen zu können.
3. Um ganz allgemein unsere immer noch recht mangelhaften Kenntnisse der normalen Variabilität der Organgestalt und Funktion zu erweitern.

Untersuchungsmaterial und Methodik.

M a t e r i a l.

Das Material zur Untersuchung stammt zum größten Teil — 74% — aus pflichtmäßigen Untersuchungen mit nach einiger Zeit auch wieder pflichtmäßig vorgenommenen Nachuntersuchungen von vollkommen Gefunden, die in unserer Poliklinik gemacht wurden. Weiteres Material — 15% — stand uns aus dem Kreis der gefunden ärztlichen Angestellten der Poliklinik zur Verfügung. Im Gegensatz zur ersten Gruppe, wo die Nachuntersuchungen nach längerer Zeit vorgenommen wurden, untersuchten wir in der zweiten Gruppe nach ganz kurzer Zeit, im Durchschnitt nach 17

Tagen. Eine weitere Gruppe stammt aus dem Krankenbestande einer Lungenfürsorge. Hierbei handelt es sich um sogenannte Umgebungsuntersuchungen, d. h. um Untersuchungen und Nachuntersuchungen, die bei Angehörigen von tuberkulös Erkrankten gemacht wurden und bei denen selbst aber kein krankhafter Befund erhoben werden konnte.

Methodik.

Die von uns ausgemessenen Röntgenbilder waren zum Teil Papieraufnahmen und zum Teil Filme. Die Technik der Herstellung war immer die gleiche. Wir photographierten im Abstände von 1,50 m, die Belichtungsdauer betrug $3/100$ bis $6/100$ sec. je nach der Dicke des Aufzunehmenden und war bei Untersuchungen und Nachuntersuchungen ein und deselben immer gleich. Auch wurde möglichst in gleicher Atemphase photographiert, d. h. in tiefer, aber nicht maximaler Inspiration. Nicht unwichtig ist fernerhin, daß fast alle Aufnahmen vom gleichen Bedienungspersonal und stets an demselben Stativ gemacht wurden. Untersuchte, die während der Aufnahme wesentlich schief im Stativ gestanden hatten, berücksichtigten wir nicht. Solche aber, bei denen der Zwerchfellstand bei Untersuchung und Nachuntersuchung verschieden groß war, mußten mit einbezogen werden. Denn dieser war nur in wenigen Fällen auf beiden Aufnahmen ganz der gleiche. In diesem Sinne haben wir auch alle die Fälle ausgeschlossen, bei denen der durchschnittliche Zwerchfellstand bei beiden Beobachtungen zwar leidlich gleich, auf den einzelnen Seiten jedoch stärker unterschiedlich war, so daß auf diese Weise analog etwa den Schaukelbewegungen des Zwerchfells nach Phrenicusexhairesis die Herzform und Herzgröße hätte wesentlich verändert werden können.


Trotz der bekannten Mängel erfolgte die Ausmessung der Herzen nach Angaben von Moritz und Dietlen. Wir stellten fest:

1. Die größte Entfernung des rechten Herzrandes von der Mittellinie = Medianabstand rechts = Mr.
2. Die größte Entfernung des linken Herzrandes von der Mittellinie = Medianabstand links = Ml.

Die Summe der Medianabstände Mr. + Ml. wird nach Moritz als „transversale Dimension“ des Herzens bezeichnet und ist in ihrer Unabhängigkeit von der Mittellinie ein bequemes Maß, um verschiedene Herzsilhouetten miteinander zu vergleichen. Der Unterschied in der Transversaldimension bei der Unterfuchung und Nachunterfuchung ist die Transversaldimensionsdifferenz oder, wie wir sie kurz bezeichnen, als Transversaldifferenz = TrDiff. Diese Transversaldifferenz kann positiv und negativ sein, und zwar ist sie positiv, wenn die Transversaldimension der zweiten Aufnahme größer ist als die der ersten und negativ, wenn sie kleiner ist als die der ersten.

Weiterhin war es notwendig, den Zwerchfellstand zahlenmäßig zu erfassen. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, dieses Ziel zu erreichen, erschien uns folgender Weg gangbar:

Die oberen äußeren Abgrenzungen der Querfortsätze des sechsten Brustwirbels verbanden wir durch eine Gerade und bestimmten auf dieser die Mitte. Dann wurden von der Mitte aus auf der Verbindung nach rechts und links je 6 cm abgetragen. In den so erhaltenen Punkten errichteten wir auf beiden Seiten bis zum Zwerchfell ein Lot, welches uns nun den Abstand des Zwerchfelles



Herzdurchmesser nach Moritz u. Dietlen.

von einer zwar willkürlich angenommenen, bei allen Röntgenbildern aber gleichen Verbindungslinie (nämlich der der sechsten Brustwirbelquerfortsätze) angab.

Den Zwerchfellstand auf der linken Seite bezeichneten wir als Zwerchfellstand links = Zwl., den auf der rechten Seite als Zwerchfellstand rechts = Zwr. Um den Zwerchfellstand beider Aufnahmen in Beziehung setzen zu können, addierten wir auf jeder Aufnahme Zwl und Zwr und errechneten das Mittel. Der erhaltene Mittelwert der ersten Aufnahme verglichen mit dem der zweiten, ergab eine Differenz, die wir als Zwerchfellsstandsdifferenz oder kurz als ZwDiff bezeichneten. Diese Zwerchfelldifferenz kann nun positiv oder negativ sein, je nachdem der mittlere Zwerchfellstand auf der zweiten Aufnahme größer oder kleiner ist als der auf der ersten Aufnahme.

Aus den Untersuchungsbögen bzw. Krankenblättern erfahen wir dann noch:

Pulsfrequenz,

Untersuchungsintervall,

Alter,

Körpergewicht.

Die Pulsfrequenz maßen wir am gleichen Vormittag des Untersuchungstages, an dem die Röntgenaufnahme gemacht wurde.

Ergebnisse.

Gesamtverhalten der Transversaldifferenzen an sich.

Um das Gesamtverhalten der Transversaldifferenzen an sich zu erkennen, addierten wir zunächst alle Transversaldifferenzen mit negativem Vorzeichen, d. h. die dadurch entstanden waren, daß auf der zweiten Aufnahme die transversale Dimension kleiner geworden war. Daselbe machten wir bei Transversaldifferenzen mit positivem Vorzeichen, d. h. bei denen auf der zweiten Aufnahme die transversale Dimension größer geworden war. Wir fanden nun, daß genau je 50% aller Fälle eine positive bzw. eine negative Transversaldifferenz hatte. Aus der Summe aller Transversaldiffe-

renzen ohne Rücksicht auf ihr Vorzeichen, errechneten wir den absoluten Durchschnitt, unter dem wir den absoluten Wert verstehen, um den sich die Fälle bei der Nachuntersuchung verändert hatten. Zur Ergänzung errechneten wir den gewöhnlichen Durchschnitt, indem wir die Differenz der positiven und negativen Transversaldifferenzen unter Berücksichtigung des Vorzeichens durch die Gesamtzahl unseres Materials dividierten.

Tabelle 1.

	Tr. Diff. Mittel	Anzahl der Fälle
absolutes Mittel	$\pm 0,5681$	116
gewöhnl. Mittel	$- 0,0508$	116

Der für den gewöhnlichen Durchschnitt erhaltene Wert von $- 0,0508$ ist aber so klein, daß er die Meinung, die Herzgröße würde sich beim Normalen nicht ändern, scheinbar bestätigt. Demgegenüber ergibt sich aber mit Hilfe der mittleren quadratischen Streuung, daß doch erheblichere Unterschiede bestehen müssen. Die mittlere quadratische Streuung berechnet man nach folgender Formel:

$$\mu = \sqrt{\frac{\text{Sa. } \delta^2}{n}}$$

wobei μ die quadratische Streuung, δ die Abweichung der einzelnen Transversaldifferenz vom gewöhnlichen Durchschnitt, und n die Gesamtzahl der Fälle bedeutet. Da der gewöhnliche Durchschnitt in diesem Falle praktisch = Null war, konnten wir für δ den Wert der einzelnen Transversaldifferenz selbst einsetzen.


Tabelle 2.

Anzahl der Fälle	quadratische Streuung
116	$\pm 0,71$

Die mittlere quadratische Streuung von $\pm 0,71$ besagt also, daß die Unterschiede beider Transversaldimensionen tatsächlich im Durch-

schnitt bedeutend höher lagen, als es der gewöhnliche Durchschnitt erkennen läßt.

Noch deutlicher waren die wirklichen Größenverhältnisse der Streuung erkennbar, bei Darstellung einer Verteilungskurve, die folgendermaßen hergestellt wurde: Auf der Waagerechten trugen wir von einem Punkte Null aus nach links die negativen und nach rechts die positiven Transversaldifferenzen ein, wobei alle Transversaldifferenzen in Gruppen bis zu 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 und 2,5 cm zusammengefaßt waren. Um möglichst genaue Werte zu erhalten, errechneten wir noch aus den Transversaldifferenzen jeder Gruppe den Mittelwert. Auf der Senkrechten zeichneten wir die in den einzelnen Gruppen gefundene Häufigkeit in Prozent der Gesamtzahl unseres Materials ein. Die Aufzeichnung dieser Zahlen ergab eine Kurve, die ihren Höhepunkt ungefähr bei Null hat. Sie zeigte aber auch, daß 25%, also ein Viertel aller Transversaldifferenzen Schwankungen von mehr als $\pm 1,0$ cm aufwiesen. (Siehe Kurve!)



Gesamtverhalten des Zwerchfellstandes an sich.

Genau wie bei den Transversaldifferenzen addierten wir zuerst die negativen Zwerchfelldifferenzen und dann die positiven,

d. h. die Fälle, bei denen der mittlere Zwerchfellstand bei der zweiten Untersuchung kleiner bzw. größer geworden war. Aus der Summe beider Zwerchfelldifferenzen, ohne Rücksicht auf ihr Vorzeichen, dividiert durch die Gesamtzahl der Fälle, erhielten wir wiederum den absoluten Durchschnitt aus ihrer Differenz unter Berücksichtigung des Vorzeichens den gewöhnlichen Durchschnitt.

Tabelle 3

Zw. Diff.

	Mittel	Anzahl der Fälle
absolutes Mittel	$\pm 0,8$	116
gewöhnl. Mittel	$\pm 0,11$	116

Beim gewöhnlichen Durchschnitt mit nur 0,11 cm ist also praktisch bei unseren Fällen der Zwerchfellstand gleich gewesen. Demgegenüber zeigt aber der Wert für den absoluten Durchschnitt mit 0,8 cm, daß der Zwerchfellstand doch im einzelnen trotz möglichst gleichartiger Technik schwankte. Dieser Eindruck verstärkte sich auch noch bei Bestimmung der zugehörigen quadratischen Streuung.

Tabelle 4.

Anzahl der Fälle	quadratische Streuung
116	$\pm 1,0$

Nachdem von uns die Schwankungen der Herzgröße beim Normalen festgestellt worden waren, mußten wir nun versuchen, die Gründe für diese Schwankungen zu ermitteln. In erster Linie dachten wir dabei an Beziehungen des Zwerchfellstandes zur Herzgröße. Zu diesem Zwecke wurden die Zwerchfelldifferenzen in drei Gruppen eingeteilt und die zugehörigen absoluten und gewöhnlichen Mittelwerte der Zwerchfelldifferenz wie der Transversaldifferenz bestimmt.

Tabelle 5.

Zw. Diff.		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl.	
unter — 0,5	— 0,98 cm	± 0,53 cm	+ 0,04	37
— 0,49 bis + 0,49	+ 0,02 cm	± 0,60 cm	— 0,05	37
über + 0,5	+ 1,16 cm	± 0,57 cm	— 0,12	42

In der ersten Gruppe von unter — 0,5 cm hat demnach die Zwerchfelldifferenz im Mittel um — 0,98 cm abgenommen, d. h. das Zwerchfell ist höher getreten und die Transversaldifferenz um + 0,04 cm zugenommen, d. h. das Herz ist größer geworden. In der dritten Gruppe von über + 0,5 cm hat die Zwerchfelldifferenz um + 1,16 cm im Mittel zugenommen, d. h. das Zwerchfell ist tiefer getreten und die Transversaldifferenz um — 0,12 cm abgenommen, d. h. das Herz ist kleiner geworden. Diese Ergebnisse decken sich zwar mit der bisherigen Anschauung, daß bei tiefstehendem Zwerchfell das Herz kleiner wird und umgekehrt aber zahlenmäßig ist der Einfluß des Zwerchfellstandes auf die Herzgröße so geringfügig, daß er als wesentliche Ursache für die gefundenen Schwankungen nicht in Frage kommen kann. Diese Folgerung bestätigt sich auch, wenn man nur die Fälle mit extremen Zwerchfellunterschieden berücksichtigt. Denn nach Tabelle 6 zeigen selbst Fälle mit einem durchschnittlichen Tiefortreten des Zwerchfelles um 1,8 cm im Mittel eine Verkleinerung der Transversaldifferenz um nicht einmal 1 mm, und ebenso diejenigen mit einem durchschnittlichen Höherentreten des Zwerchfelles um 1,4 cm auch nur eine Vergrößerung um etwa 2 mm.

Tabelle 6.

Zw. Diff.		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl.	
über + 1,0 cm (von + 1,0 bis + 2,25)	+ 1,77	± 0,58	— 0,07	15
unter — 1,0 cm (von — 1,0 bis — 2,5)	— 1,35	± 0,41	+ 0,23	17

Daß Beziehungen zwischen Pulsfrequenz und Herzgröße bestehen, wurde folgendermaßen bewiesen. Bei allen Fällen, wo die Pulsfrequenz bei der Nachuntersuchung mindestens um 15 zu- oder abgenommen hatte, ermittelten wir bei Puls- und zugehöriger Transversaldifferenz den absoluten Durchschnitt und bei der Transversaldifferenz auch noch den gewöhnlichen. Bei Frequenzerhöhung nahm dann der gewöhnliche Durchschnitt der Transversaldifferenz ab und umgekehrt, d. h. in den Fällen, in denen der Puls wesentlich beschleunigter war, wurde das Herz tatsächlich kleiner und umgekehrt.

Tabelle 7.

Pulsfrequenz		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut Durchschnitt	gewöhnlich. Durchschnitt	
Zunahme um mehr als 15	+ 19,4	$\pm 0,36$	— 0,28	5
Abnahme um mehr als 15	— 24,14	$\pm 0,5$	+ 0,36	7

Um zu erkennen, welche Rolle die Größe der einzelnen Herzen an sich bei den Größenschwankungen spielt, teilten wir alle Transversaldimensionen, d. h. Herzgrößen bei der Erstuntersuchung in drei verschiedene Gruppen mit ihren zugehörigen Transversaldifferenzen ein. Von Herzgröße und Transversaldifferenzen bestimmten wir den absoluten Durchschnitt und von den Transversaldifferenzen auch wiederum den gewöhnlichen Durchschnitt.

Tabelle 8.

Herzgröße (Transversaldimension)		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut Durchschnitt	gewöhnlich Durchschnitt	
kl. als 12,7	12,12	$\pm 0,54$	+ 0,09	42
v. 12,71 bis 13,69 cm	13,20	$\pm 0,52$	— 0,05	34
gr. als 13,7	14,57	$\pm 0,62$	— 0,20	40

Die Tabelle 8 zeigt, daß die kleinen Herzen bei der Nachuntersuchung an Größe zunahmen und die großen abnahmen. Um diese Feststellungen noch deutlicher herauszuarbeiten, bestimmten wir bei den extrem großen bzw. extrem kleinen Herzen absoluten und gewöhnlichen Durchschnitt von Herzgröße und Transversaldifferenzen und fanden prinzipiell genau dieselben Werte. Die großen Herzen nahmen an Größe ab, die kleinen nahmen an Größe zu.

Tabelle 9.

Herzgröße (Transversaldimension)		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl. Durchschnitt	
kl. Herzen (v. 10,7 bis 12,0 cm)	11,52	$\pm 0,56$	$+ 0,04$	15
gr. Herzen (v. 14,6 bis 16,0 cm)	15,35	$\pm 0,58$	$- 0,39$	15

Daß Gewichtszunahme oder -Abnahme auf die Schwankungen der Herzgröße auch einen Einfluß hat, zeigten wir bei allen Fällen, bei denen das Gewicht bei der Nachuntersuchung um mindestens 3,0 kg zu- oder abgenommen hatte. Für das Gewicht und für die zugehörigen Transversaldifferenzen errechneten wir den absoluten und gewöhnlichen Durchschnitt. Die Fälle mit Gewichtszunahme nahmen auch an Herzgröße zu. Nach unseren Ergebnissen allerdings auch die mit Gewichtsabnahme, was vielleicht bedingt ist durch die geringe Anzahl der Untersuchten, die an Gewicht abgenommen hatten.

Tabelle 10.

Gewichtsänderung		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl. Durchschnitt	Anz. d. Fälle
Abnahme um mehr als 3 kg	$- 4,17$	$\pm 0,31$	$+ 0,05$	7
Zunahme um mehr als 3 kg	$+ 4,53$	$\pm 0,56$	$+ 0,25$	22

Untersuchungsalter und die Größe des Intervalls der Untersuchungzeit spielen bei den Änderungen der Herzgröße nach unseren Ergebnissen keine Rolle. Wir ermittelten das Durchschnittsalter aller Untersuchten und fanden, daß der gewöhnliche Durchschnitt aller Transversaldifferenzen bezogen auf das unterdurchschnittliche Alter von 26 Jahren sich genau so verhielt wie bei allen mit überdurchschnittlichem Alter.

Tabelle 11.

Alter		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl. Durchschnitt	
Unterdurchschnittl. Alter	22,45	$\pm 0,53$	$- 0,05$	74
Überdurchschnittl. Alter	33,57	$\pm 0,62$	$- 0,06$	42

Ähnlich war es mit den Beziehungen des Untersuchungsintervalls zur Herzgrößenschwankung, d. h. also zur Transversaldifferenz. Die nach unterdurchschnittlichem Untersuchungsintervall Untersuchten verhielten sich in ihren Transversaldifferenzen genau so wie die nach überdurchschnittlichem Untersuchungsintervall Untersuchten.

Tabelle 12.

Untersuchungsintervall Durchschn. 307 Tage		Tr. Diff.		Anz. d. Fälle
Bereich	Durchschnitt	absolut. Durchschnitt	gewöhnl. Durchschnitt	
Unterdurchschn. U. I.	190	$\pm 0,62$	$- 0,07$	64
Überdurchschn. U. I.	451	$\pm 0,49$	$- 0,02$	52

Ergänzende kymographische Untersuchungen.

Die tatsächlichen Größenschwankungen gesunder Herzen im Ablauf eines Herzzyklus sind nur im Kymogramm genau festzuhalten. Wir maßen deshalb am rechten und linken Herzrande in

der Gegend von Mr und Ml, wo ja auch unsere Röntgenmessungen gemacht worden waren, die maximalen Differenzen zwischen Systole und Diastole. Wie bisher vielfach in kymographischem Schrifttum üblich, addierten wir diese auf der linken und rechten Herzseite gefundenen Differenzen von systolischer und diastolischer Herzgröße. Der auf diese Weise bei elf gefunden Probanden im Alter von durchschnittlich 26 Jahren ermittelte Wert betrug im Durchschnitt 0,63 cm, was grundsätzlich etwa den von Stumpf angegebenen Werten entspricht. Diese Zahl erscheint zunächst etwas größer als der für unser Gesamtmaterial ermittelte Durchschnitt der Transversaldifferenzen von 0,56 cm, und es könnte deshalb scheinen, als ob die beobachteten Unterschiede in der Herzgröße wirklich ganz oder zum mindesten im wesentlichen dadurch bedingt wären, daß die Herzen jeweils einmal in der Systole, das andere Mal in der Diastole zur Aufnahme kamen. Eine solche Auffassung scheint indes schon wenig befriedigend angesichts der Tatsache, daß wir bei unserem Material Unterschiede in der Transversaldifferenz von über $\pm 1,0$ cm in 25% aller Fälle fanden, Stumpf dagegen unter 218 Fällen nur bei 4 bis 5, das sind etwas mehr als 2%, eine Verkleinerung des Transversaldurchmessers über 1,0 cm durch die Systole fand. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß eine einfache Summierung der auf der rechten und linken Seite des Herzens im Kymogramm für Systole und Diastole gefundenen maximalen Differenzen zu einer einheitlichen Zahl nicht statthaft ist, weil bekanntlich Ventrikel und Vorhofssystole zeitlich nicht zusammenfallen. Der Vorhof befindet sich vielmehr schon während der Ventrikelsystole im Anfangsteil seiner Diastole. Notwendig ist es deshalb, auf einer Seite des Herzens des Kymogramms z. B. auf der linken, die maximale Differenz zwischen Systole und Diastole in Beziehung zu setzen zu der zeitlich zugehörigen Differenz auf der rechten Seite. Es ist dann ohne weiteres klar, daß die auf diese Weise ermittelten Transversaldimensionen für Systole und Diastole kleiner ausfallen müssen als die im kymographischen Schrifttum bisher benutzte Maßzahl. Da sich theoretisch jedoch keine bestimmten Annahmen über das

Größenverhältnis dieser beiden Maßzahlen machen ließen, haben wir daselbe an Hand unserer elf Kymogramme durch Messung bestimmt. Dabei ergab sich in der Tat, für die richtige Transversaldifferenz zwischen Systole und Diastole ein deutlich kleinerer Wert als die bisher übliche Maßzahl. Dieser liegt nunmehr mit 0,51 cm schon unter dem von uns ermittelten absoluten Durchschnitt der Transversaldifferenzen bei den verschiedenen Nachuntersuchungen. Ist danach also noch unwahrscheinlicher, daß die von uns gefundenen Schwankungen des Transversaldurchmessers durch Unterschiede in der jeweils zugehörigen Herztätigkeitsphase (Systole und Diastole) bedingt sind, so ist noch ganz besonders folgendes zu beachten: Die im Kymogramm gefundenen Transversaldifferenzen betreffen die Unterschiede zwischen Maximum bzw. Endpunkt der Diastole einerseits und Maximum bzw. Endpunkt der Systole andererseits. Bei der Kürze der Zeitintervalle dieser beiden Phasen der Herztätigkeit gegenüber der Gesamtdauer des Herzzyklus ist es aber ganz unwahrscheinlich bzw. praktisch ausgeschlossen, daß im Durchschnitt die Aufnahme bei unseren Probanden jeweils gerade während des Maximums der Systole bzw. des Maximums der Diastole gemacht sein sollte. In Wirklichkeit werden im Durchschnitt bei den verschiedenen Nachuntersuchungen ganz überwiegend Phasen der Herztätigkeit in der Aufnahme festgehalten sein, welche sich sehr viel weniger in ihren Transversaldurchmessern unterscheiden, als der Endpunkt der Systole vom Endpunkt der Diastole.

Anzahl der ausgemessenen Kymogramme	Max. syst.-diast. Diff. d. Tr. Durchm.	zeitgerechte syst.-diast. Diff. d. Transvers. Durchm.
11	0,63 cm	0,51 cm

Zusammenfassung.

Unsere Untersuchungen über die Schwankungen der Herzgröße haben eine

1. praktische,
2. theoretische Bedeutung.

Praktisch wichtig sind sie deshalb, weil sie gezeigt haben, daß die Größe des gefunden Herzens beim einzelnen Menschen an sich doch viel variabler ist, als man bisher angenommen hat. Dieses bedeutet für die Klinik viel vorsichtiger zu sein in der funktionellen und prognostischen Beurteilung von Änderungen in der Herzgröße. Zum Beispiel sind die von uns festgestellten Herzgrößenschwankungen von Bedeutung bei Gutachten und Rentenbeurteilungen; denn es geht nicht an, bei Vergrößerung des Herzens bei einer Nachuntersuchung sofort von Herzerweiterung zu sprechen, wenn diese nicht mindestens den Wert von 0,7 cm bis 0,9 cm überschreitet. Größenschwankungen innerhalb dieses Bereiches dürfen nach unseren Untersuchungen vielmehr nur dann als Ausdruck wirklicher Änderungen im Funktionszustand des Herzens gewertet werden, wenn sie durch wiederholte Untersuchungen — selbstverständlich unter möglichst gleichen Bedingungen — sich als konstant erweisen. Ebenso nötigen unsere Feststellungen zu großer Vorsicht in der Beurteilung von Herzkranken, bei denen während einer bestimmten Behandlungsart etwaige Schwankungen in der Herzgröße auftreten. Es müssen zwar noch im einzelnen beim kranken Herzen analoge Erfahrungen über die Spontananschwankungen gesammelt werden, aber trotzdem erklärt die Größenordnung der von uns schon beim Gefunden gefundenen Spontananschwankungen sicherlich schon heute Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten über die Auswirkung von therapeutischen Maßnahmen überhaupt.

In theoretischer Hinsicht haben unsere Untersuchungen zwar keine volle Klarheit ergeben, welche Faktoren die von uns beim Gefunden beobachteten Herzgrößenschwankungen im einzelnen bedingen. Sie haben aber mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß es ganz

vorwiegend Faktoren haemodynamischer Art sein müssen, wobei sicherlich die Pulsfrequenz eine bedeutende Rolle spielt. Weiterhin ist damit zu rechnen, wie uns auch gelegentliche Beobachtungen im Kymogramm zeigten, daß bei gleichen Bedingungen hinsichtlich Zwerchfell- und Rippenstand die Haemodynamik der Herzfüllung durch Unterschiede im intraabdominellen Druck wesentlich beeinflusst werden kann, und zwar in der Richtung, wie sie aus den Bedingungen des Valsalva'schen Versuches einerseits bzw. des Müller'schen Versuches andererseits bekannt und namentlich durch die Arbeiten von Bürger, Nolte, Schlomka und Lammers geklärt sind. Die Klärung dieser Fragen muß weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, sie erscheint aber zweifellos von grundsätzlicher Bedeutung für die ganze Frage der Herzgrößenbestimmungen im Röntgenbilde und ihre funktionelle Auswertung.

Literaturverzeichnis.

- Bürger, M.: Blutkreislauf in „Normale und pathologische Physiologie der Leibesübungen von Knoll-Arnold“. Leipzig 1933, S. 90.
- Schlomka-Lammert: Das Belastungselektrokardiogramm IV. Mitteil. Arbeitsphysiologie. Bd. 8.
- Nolte, F. A.: Über die Veränderung der Herzform und Größe unter der Einwirkung intrapulmonaler Drucksteigerung nach kardiokymographischen Untersuchungen (Das Kardiokymogramm im Valsalva'schen Versuch). Fortschritt a. d. Geb. der Röntgenstrahlen. Bd. 50 (1934) H. 3.
- Dietlen: Über Herzgröße und Herzmessung. Klin. Wchschr. 1922. Nr. 42.
- Über Größe und Lage des normalen Herzens, 23. Kongreß für innere Medizin, 1906.
- Moritz: Über Veränderungen in der Form, Größe und Lage des Herzens beim Übergang aus horizontaler in vertikaler Körperstellung. Dtsch. Arch. f. klin. Med. 82.
- Stumpf: Röntgenkymographische Bewegungslehre innerer Organe. S. 74.
-

Lebenslauf.

Ich, Heinz Daum, wurde am 1. Januar 1912 als Sohn des Betriebsführers Heinrich Daum und seiner Frau Emma geb. Hegenberg in Homberg am Niederrhein geboren. Ich besuchte die Städtische Vorschule in Homberg, die Volksschule in Vluyn, Kreis Moers, anschließend die Rektoratschule in Neukirchen und die Oberrealschule in Moers. Mein Abitur bestand ich im März 1930. Danach studierte ich Medizin in Marburg, Heidelberg, Königsberg, München und Bonn. Im Oktober 1932 bestand ich das medizinische Vorexamen in Marburg, im Januar 1936 das medizinische Staatsexamen in Bonn. Seit dem 1. Februar 1936 arbeite ich als Medizinalpraktikant an der medizinischen Universitätspoliklinik in Bonn unter Leitung von Herrn Professor Dr. med. Max Bürger.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dozent Dr. Schlomka für die Übernahme des Referats und für die jederzeit freundlich gewährte Unterstützung bei der Abfassung der Arbeit zu danken. Herrn Prof. Dr. med. Bürger danke ich für die Übernahme des Korreferates!

